BOWI-SEPT®

Flüssige Flächendesinfektion

Art.-Nr. 2760

0324

Einsatzkonzentration und Einwirkzeiten nach Bereich und Anwendungsart:

Einwirkzeiten für die Flächendesinfektion mit Mechanik (Wischen/Sprühen+Wischen):

Je nach gewünschter Einwirkzeit und Wirksamkeit wird **BOWI-SEPT®** entsprechend der Tabelle verdünnt und die zuvor gereinigten Flächen nass bis feucht gewischt. Flächen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, müssen nach der empfohlenen Einwirkzeit mit klarem Wasser nachgespült werden.

Verdünnung und Einwirkzeit nach VAH (Flächendesinfektion mit Mechanik; Bakterizidie/Levurozidie):

1:16	(6,0%ig)	5 Minuten	1:50 (2,0%ig)	15 Minuten	1:100 (1,0%ig)	30 Minuten

Im (veterinär)medizinischen Bereich, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und im industriellen/institutionellen Bereich:

1:50 (2%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid
1:33 (3%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:25 (4%ig)	1 Minute	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:20 (5%ig)	30 Minuten[1)]	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid plus
1:20 (5%ig)	60 Minuten[2)3)]	bakterizid/levurozid/viruzid/fungizid

Im Veterinärbereich (Stallungen) bei 10°C:

1:50 (2%ig)	15 Minuten	bakterizid/levurozid
1:16 (6%ig)	30 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid

Einwirkzeiten für die Flächendesinfektion ohne Mechanik (Sprühen/Schütten):

Im medizinischen Bereich:

1:33 (3%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:20 (5%ig)	30 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid plus
1:20 (5%ig)	60 Minuten	bakterizid/levurozid/viruzid

In lebensmittelverarbeitenden Betrieben und im industriellen/institutionellen Bereich:

1:33 (3%ig)	15 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:25 (4%ig)	1 Minute[1)]	bakterizid/begrenzt viruzid
1:25 (4%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:20 (5%ig)	30 Minuten	bakterizid/levurozid/viruzid[4)]

[1)] gilt nicht für den Lebensmittelbereich
[2)] im Lebensmittelbereich 30 Minuten Einwirkzeit für bakterizid/levurozid/viruzid
[3)] gilt nicht im veterinärmedizinischen Bereich
[4)] im industriellen/institutionellen Bereich nur begrenzt viruzid plus

Einwirkzeit für sonstige Anwendungen:

Desinfektion von nichtmedizinischen Instrumenten und Equipment durch Einlegen:

1:33 (3%ig)	15 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de