

# **BOWI-SEPT®**

Flüssige Flächendesinfektion

Art.-Nr. 2760





## Einsatzkonzentration und Einwirkzeiten nach Bereich und Anwendungsart:

### Einwirkzeiten für die Flächendesinfektion mit Mechanik (Wischen/Sprühen+Wischen):

Je nach gewünschter Einwirkzeit und Wirksamkeit wird BOWI-SEPT® entsprechend der Tabelle verdünnt und die zuvor gereinigten Flächen nass bis feucht gewischt. Flächen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, müssen nach der empfohlenen Einwirkzeit mit klarem Wasser nachgespült werden.

Verdünnung und Einwirkzeit nach VAH (Flächendesinfektion mit Mechanik; Bakterizidie/Levurozidie):

1:16 (6,0%ig)	5 Minuten	1:50 (2,0%ig)	15 Minuten	1:100 (1,0%ig)	30 Minuten

#### Im (veterinär) medizinischen Bereich, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und im industriellen/institutionellen Bereich:

1:50 (2%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid
1:33 (3%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:25 (4%ig)	1 Minute	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:20 (5%ig)	30 Minuten <sup>1)</sup>	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid plus
1:20 (5%ig)	60 Minuten <sup>2)3)</sup>	bakterizid/levurozid/viruzid/fungizid

### Im Veterinärbereich (Stallungen):

1:50 (2%ig)	15 Minuten	bakterizid/levurozid
1:16 (6%ig)	30 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid

## Einwirkzeiten für die Flächendesinfektion ohne Mechanik (Sprühen/Schütten):

#### Im medizinischen Bereich:

1:33 (3%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:20 (5%ig)	30 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid plus
1:20 (5%ig)	60 Minuten	bakterizid/levurozid/viruzid

### In lebensmittelverarbeitenden Betrieben und im industriellen/institutionellen Bereich:

1:33 (3%ig)	15 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid	
1:25 (4%ig)	1 Minute <sup>1)</sup>	bakterizid/begrenzt viruzid	
1:25 (4%ig)	5 Minuten	bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid	
1:20 (5%ig)	30 Minuten	bakterizid/levurozid/viruzid <sup>4)</sup>	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> gilt nicht für den Lebensmittelbereich

## Einwirkzeit für sonstige Anwendungen:

Desinfektion von nichtmedizinischen Instrumenten und Equipment durch Einlegen:

1:33 (3%ig) 15 Minuten bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> im Lebensmittelbereich 30 Minuten Einwirkzeit für bakterizid/levurozid/viruzid

<sup>3)</sup> gilt nicht im veterinärmedizinischen Bereich

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> im industriellen/institutionellen Bereich nur begrenzt viruzid plus